

## GUIDA ALLA CAMPAGNA VACCINALE 2024-2025 DELLA REGIONE LAZIO

**Gentili colleghi e colleghe,**

la **Campagna Vaccinale 2024-2025**, che come di consueto ci vedrà a breve protagonisti in prima linea, si preannuncia quanto mai impegnativa sia per l'allargarsi della platea dei pazienti a rischio, che per il sempre crescente fenomeno dell'esitazione vaccinale.

Per questo è quanto mai importante il nostro impegno.

La **FIMMG Lazio** è certa di farvi cosa gradita inviandovi in estrema sintesi le condizioni economiche dell'accordo per la campagna 2024-2025 insieme ad una guida pratica alla vaccinazione FLU e PNEUMO realizzata dal board scientifico dell'**area vaccini e malattie infettive della Società Italiana Interdisciplinare Cure Primarie (SIICP)**

### VACCINO ANTINFLUENZALE

<b>Remunerazione vaccino</b>	<b>ambulatoriale</b>	6,16 euro + <u>funzione vaccinale</u>
	<b>a domicilio</b>	20,00 euro + <u>funzione vaccinale</u>

**Funzione vaccinale** (da sommare alla remunerazione vaccino)

Utilizzo di <b>almeno il 90%</b> delle dosi assegnate	5,00 euro
Per utilizzo delle dosi <b>tra 80 e 89.9%</b>	4,00 euro
Per utilizzo tra <b>65 e 79.9%</b>	2,00 euro
Per utilizzo <b>inferiore al 65%</b> non è previsto alcun contributo aggiuntivo	--

### VACCINO ANTIPNEUMOCOCCO

Remunerazione base	6,16 euro
+	
Contributo funzione vaccinale	2,00 euro

### VACCINO ANTICOVID

<b>Remunerazione vaccino</b>	<b>ambulatoriale</b>	10,16 euro
	<b>a domicilio</b>	29,06 euro

## Vaccinazione Antinfluenzale REGIONE LAZIO

### Fasce d'età e tipologia vaccini campagna 2024-25

#### **Dai 6 mesi in su: VAXIGRIP TETRA**

*Vaccino influenzale quadrivalente, virus frammentati "split", inattivati*

- Contiene i ceppi: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09, A/Darwin/9/2021(H3N2), B/Austria/1359417/2021, B/Phuket/3073/2013
- Può contenere tracce di uova, neomicina, formaldeide e 9-ottoxino

#### **Dai 2 anni fino a 18 anni: FLUENZ**

*Vaccino vivo attenuato, somministrato per via nasale*

- Contiene i ceppi: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09, A/Darwin/9/2021(H3N2), B/Austria/1359417/2021
- Può contenere tracce di uova

**La Regione Lazio raccomanda di utilizzare in via preferenziale  
il vaccino FLUENZ dai 2 ai 7 anni**

#### **Dai 2 anni in su: FLUCELVAX TETRA**

*Vaccino antinfluenzale quadrivalente, antigene di superficie, inattivato, prodotto in colture cellulari*

- Contiene i ceppi: A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09, A/Darwin/6/2021(H3N2), B/Austria/1359417/2021, B/Phuket/3073/2013
- Non contiene tracce di uova, ma può contenere tracce di beta-propiolattone, cetiltrimetilammonio bromuro e polisorbato 80

## Vaccinazione Antinfluenzale REGIONE LAZIO

### Fasce d'età e tipologia vaccini campagna 2024-25

#### **Dai 50 anni in su: FLUAD TETRA**

*Vaccino antinfluenzale quadrivalente adiuvato, antigene di superficie, inattivato*

- Contiene i ceppi: A/Victoria/4897/2022(H1N1)pdm09, A/Darwin/9/2021(H3N2), B/Austria/1359417/2021, B/Phuket/3073/2013
- Può contenere tracce di uova, kanamicina solfato, formaldeide e idrocortisone

#### **Dai 60 anni in su: EFLUELDA TETRA**

*Vaccino antinfluenzale quadrivalente ad alta concentrazione (60 microgrammi HA/ceppo), virione split inattivato*

- Contiene i ceppi: A/Victoria/4897/2022(H1N1)pdm09, A/Darwin/9/2021(H3N2), B/Austria/1359417/2021, B/Phuket/3073/2013
- Può contenere tracce di uovo e formaldeide

**Dopo i 64 anni il Ministero della Salute raccomanda di utilizzare i vaccini potenziati (FLUAD TETRA E EFLUELDA TETRA)**

**Annotazione FIMMG Lazio: il protocollo della Regione Lazio prevede di somministrare prioritariamente EFLUELDA a pazienti che abbiano compiuto almeno 80 anni che siano ad alto rischio, istituzionalizzati o vaccinati a domicilio**

## VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCCICA REGIONE LAZIO

### PREMESSA

*Le infezioni da Pneumococco, prima causa di polmonite batterica e di patologie invasive gravi quali meningite, sepsi e batteriemia, sono tra le principali cause di mortalità e morbilità nel mondo. Il nuovo PNPV 2023-25 individua nella vaccinazione antipneumococcica, livello essenziale di assistenza, una priorità di sanità pubblica, anche nell'importante ruolo di contrasto all'antimicrobicoresistenza/*

*La Regione Lazio individua nel 75% l'obiettivo minimo di copertura da raggiungere, sia sui soggetti ultrasessantacinquenni, che su quelli di età inferiore a rischio per patologia.*

### POPOLAZIONE TARGET

- ❖ **PERSONE DI ETÀ ≥ 65 ANNI**
- ❖ **PERSONE DI ETÀ' < 65 ANNI A RISCHIO DI CONTRARRE LA MALATTIA PER LA PRESENZA DELLE SEGUENTI PATOLOGIE O CONDIZIONI PREDISPONENTI:**
  - ✓ *Cardiopatie croniche*
  - ✓ *Malattie polmonari croniche*
  - ✓ *Diabete Mellito*
  - ✓ *Epatopatie croniche, inclusa la cirrosi epatica e le epatopatie croniche evolutive da alcool*
  - ✓ *Alcoolismo cronico*
  - ✓ *Soggetti con perdite liquorali da traumi o intervento*
  - ✓ *Presenza di impianto cocleare*
  - ✓ *Emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassemia*
  - ✓ *Immunodeficienze congenite o acquisite*
  - ✓ *Infezione da HIV*
  - ✓ *Condizioni di asplenia anatomica o funzionale e pazienti candidati alla splenectomia*
  - ✓ *Patologie onco-ematologiche (leucemie, linfomi e mieloma multiplo)*
  - ✓ *Neoplasie diffuse*
  - ✓ *Trapianto d'organo o di midollo*
  - ✓ *Patologie richiedenti un trattamento immunosoppressivo a lungo termine*
  - ✓ *Sindrome nefrosica o insufficienza renale cronica*
- ❖ **OPERATORI SANITARI**

### ATTUALI RACCOMANDAZIONI D'USO

- **PERSONE CHE INIZIANO IL CICLO VACCINALE (dai 2 anni)**  
Raccomandato **VACCINO CONIUGATO 20-VALENTE PREVENAR 20 (APEXXNAR)** ha cambiato denominazione)
- **PERSONE CHE HANNO RICEVUTO PREVENAR 13**  
Schedula sequenziale con somministrazione a distanza di almeno un anno del **VACCINO POLISACCARIDICO NON CONIUGATO 23- VALENTE PNEUMOVAX**
- **PERSONE CHE HANNO COMPLETATO LA SCHEDULA SEQUENZIALE**  
Al momento non previsti ulteriori vaccini

## NOVITÀ IN CASO DI PRECEDENTE VACCINAZIONE

**RACCOMANDAZIONI ADVISORY COMMITTEE ON IMMUNIZATION PRACTICES, CDC, USA, Settembre 2023** (*novità in caso di precedente vaccinazione*)

- **PERSONE CHE HANNO RICEVUTO PREVENAR 13:**  
Raccomandato **PCV20 PREVENAR 20** dopo almeno un anno in alternativa a **PPSV23 PNEUMOVAX**
- **PERSONE CON PATOLOGIA CHE HANNO RICEVUTO PCV13 SEGUITO DA PPSV23:**  
Possibile raccomandare **PCV20 PREVENAR 20** in alternativa a **PPSV23** a distanza di almeno 5 anni

<https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/72/rr/rr7203a1.htm#recommendationsforuseofpneumococcalvaccinesinadultsaged%E2%89%A565years>

*le raccomandazioni **ACIP** non sono attualmente recepite nel protocollo di vaccinazione.*



**A CURA DI:**

**Ombretta Papa; Roberto Ieraci; Antonietta Spadea**  
**AREA VACCINI E MALATTIE INFETTIVE SIICP**